

# 接種スケジュール表

★接種スケジュールの目安を簡易的に示したものです。詳しくは、「予防接種と子どもの健康」を参考に、接種スケジュールを立てましょう。

★任意接種は、保護者の希望で行う予防接種です。いずみ市では助成をしていますので、接種を希望される方はお子さんの母子健康手帳・保護者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）をお持ちのうえ、保護者の方が大原保健センター窓口へお越しください。

★スケジュールを立てるうえでご不明な点がございましたら、健康高齢者支援課 健康づくり班（大原保健センター）：☎62-1162へお問い合わせください。

ワクチン種類 赤色... 生ワクチン      ワクチン種類 青色... 不活化ワクチン

ワクチンの種類	出生時	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	1歳6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳6か月	接種間隔と注意点
<b>ロタウイルス ロタリックス 1価</b>		①																<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 27日以上あけて2回接種する。</li> <li>・ 初回接種は生後14週6日までに開始することが望ましい。</li> </ul>
生後6週～24週		→																
<b>ロタウイルス ロタテック 5価</b>		①																<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 27日以上あけて3回接種する。</li> <li>・ 初回接種は生後14週6日までに開始することが望ましい。</li> </ul>
生後6週～32週		→																
<b>B型肝炎</b>		①	②															<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1回目接種後27日以上あけて2回目を接種。</li> <li>・ 3回目は1回目の接種から139日以上あける。</li> <li>※3回目を忘れてしまいがちなので注意。</li> </ul>
1歳未満		→																
<b>小児の肺炎球菌 感染症</b>		①	②	③														<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2歳未満までに27日以上あけて1～3回目を接種。</li> <li>※2回目接種が1歳を超える場合は3回目の接種不可。</li> <li>追加</li> <li>・ 3回目終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に。標準的には3回目終了後、60日以上の間隔をおいて生後12か月以降に接種。</li> </ul>
生後2か月～5歳未満		→																
<b>5種混合 (ジフテリア・百日せき・ ポリオ・破傷風・ヒブ)</b>		①	②	③														<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 20日以上あける。標準的には生後2か月～7か月未満までに開始し、20日以上56日までの間隔をおいて接種。</li> <li>追加</li> <li>・ 3回目終了後、6か月以上あけて接種。標準的には3回目終了後、6～18か月までの間隔をおいて接種。</li> </ul>
生後2か月～7歳半未満		→																
<b>BCG</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 標準的には生後5～8か月に接種。</li> </ul>
1歳未満		→																
<b>日本脳炎</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6日以上あけて28日までの間隔で</li> <li>1期①</li> <li>1期②</li> <li>1期追加</li> <li>・ 1期初回2回目終了後、6か月以上あけて接種。標準的にはおおむね1年後に接種。</li> </ul>
生後6か月～7歳6か月未満まで		→																
<b>MR (麻しん風しん 混合)</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1期は1歳のお誕生日を迎えたらできるだけ早く接種する。</li> <li>・ 2期は忘れてしまうことが多いので注意。</li> </ul>
1期:1歳から2歳未満 2期:保育所年長の1年間		→																
<b>みずぼうそう (水痘)</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1歳から接種できます。標準的には生後12～15か月で接種。</li> <li>①</li> <li>②</li> <li>・ 1回目接種後、6～12か月後に2回目を接種。3歳未満までに接種。</li> </ul>
1歳～3歳未満		→																
<b>おたふくかぜ</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1歳から接種可能。生後12～15か月で接種が望ましい。</li> <li>①</li> <li>②</li> <li>・ 2回目は1回目の接種から2～4年あけて、5～6歳で接種が望ましい。保育所年長の1年間がお勧め。</li> </ul>
1歳～小学校入学前まで		→																
<b>ポリオ 任意追加</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所年長の1年間</li> <li>(4月1日～3月31日まで)</li> </ul>
保育所年長の1年間		→																
<b>3種混合 任意追加</b>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定期予防接種の4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)または5種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ)を含めて、計4回の接種を完了している方が対象。</li> <li>追加</li> <li>・ 定期予防接種の4種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風)または5種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ)を含めて、計4回の接種を完了していることが申請の条件。</li> </ul>
保育所年長の1年間		→																

ロタウイルスは  
どちらか一つを選んで接種。

定期接種  
(予防接種法に基づく接種)

任意接種  
(保護者の判断で実施する)